

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Wafd
<b>DATE:</b>	02-May-2016
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	600,000
<b>TITLE :</b>	New drug for heart failure patients
<b>PAGE:</b>	10
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Agency Generated News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report
<b>AVE:</b>	12,285

# علاج جديد لمرضى قصور عضلة القلب



العلاج الجديد يخفف معدل الوفاة لدى مريض قصور القلب

وتؤكد نتائج التحليل أيضاً أن علاج مرضي قصور القلب الانقباضي بمقارنة إنترستو خفض معدلات وفاتهم الناتجة عن الانقباضي بالمقارنة مع المرضى الآخرين بغض النظر عن العلاجات التقليدية المستخدمة سابقاً. أجريت هذه التحليل على أكبر دراسة إكلينيكية لمريض قصور القلب لمقارنة العقار الجديد بالأدوية التقليدية المتاحة حالياً. وتم عرضها خلال المؤتمر العلمي السنوي الخامس والستين للكلية الأمريكية لطب القلب بولاية شيكاجو.

وتؤكد نتائج التحليل أيضاً أن علاج مرضي قصور القلب في المستشفى بسبب قصور القلب بحوالي ٢٠٪ مقارنة بالعقارات التقليدية الأخرى بغض النظر عن العلاجات التقليدية المستخدمة سابقاً. أجريت هذه التحليل على بحسب قصور القلب بحوالي ٢٠٪، ويشمل ذلك المرضى المستقررين إكلينيكياً بغض النظر عن العلاجات التقليدية المستخدمة سابقاً.

في تحليل آخر للدراسة سجل إنترستو فوائد متسقة بين مرضي قصور القلب الانقباضي، إذ خفض معدلات الوفاة

أعلنت شركة نوفارتس للأدوية عن تحاليل جديدة أجرتها على نتائج دراسة PARADIGM-HF. أكدت نجاح عقار إنترستو (ساكوبتيريل/فالسارتان) في علاج مرضي قصور القلب الانقباضي حتى في حالة اعتبار المرضى مستقررين إكلينيكياً. وأجريت تحليل على المرضى وأظهرت النتائج أنه حتى في حالة اعتبار المرضى مستقررين إكلينيكياً -وهم المرضى الذين لم يسبق لهم، أو سبق لهم منذ زمن بعيد الإقامة في المستشفى لعلاج قصور القلب- يظل هؤلاء المرضى عرضة لأزمة إكلينيكية حادة.. وأشار إجراء التحليل نحو أكثر من ثلث المرضى تم اعتبارهم مستقررين إكلينيكياً، ومنهم ٢٠٪ مروا بأزمات أولية أساسية (الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو الإقامة في المستشفى لعلاج قصور القلب)، ٥١٪ من هؤلاء المرضى كانت الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية هي الحدث الأول الذي تعرضوا له، بالإضافة لذلك أقر التحليل أن إنترستو ساعد المرضى الذين تم اعتبارهم مستقررين إكلينيكياً بنفس قدر مساعدة المرضى الأقل استقراراً (الإقامة في المستشفى لعلاج قصور القلب خلال الثلاثة أشهر الأولى).

وفي كلتا المجموعتين ساعد إنترستو على خفض معدلات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أو الإقامة في المستشفى بسبب قصور القلب بحوالي ٢٠٪ أو أكثر، مقارنة بمن عولجوا بالعقارات التقليدية.

أكَّدَ فاس ناراسيمان رئيس الإدارة الطبية وتطوير الأدوية بشركة نوفارتس هذا التحليل الجديد أن مرضي قصور القلب لا يمكن أن تستقر حالاتهم تماماً، وذلك في ظل وفاة غالبية المرضى عند تعزفهم لأول أزمة إكلينيكية، ونظراً لاستمرار تدهور الحالات الصحية للمريض لا يمكننا الانتظار لاستخدام إنترستو لدعم فرص نجاتهم.