

PRESS CLIPPING SHEET

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| PUBLICATION: | Al Wafd |
| DATE: | 02-Oct-2017 |
| COUNTRY: | Egypt |
| CIRCULATION: | 30,000 |
| TITLE : | New gastric cancer treatment launched |
| PAGE: | 08 |
| ARTICLE TYPE: | Agency-Generated News |
| REPORTER: | Staff Report |
| AVE: | 31,500 |

إطلاق عقار جديد لعلاج سرطان المعدة

الملح والطعام المدخن، وتناول كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات وتناول الطعام الذي يحتوي على فطر «الفاتوكسين» ووجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة والعدوى ببكتيريا المعدة الحلزونية والتهاب المعدة طويل المدى وفقر الدم الخبيث والتدخين والتهاب المعدة السيلالي.

أكد الدكتور محمد عبد الله، أستاذ طب الأورام الإكلينيكي بكلية طب جامعة القاهرة، تعتمد خيارات العلاج على مرحلة تطور المرض وصحة المريض وما يفضل بوجه عام، ويعتبر الاستئصال الجراحى للورم هو العلاج الشافى الوحيد لسرطان المعدة، بينما يهدف العلاج الدوائى إلى إطالة فترة بقاء المريض وتحسين جودة حياته وذلك إذا كانت حالته تسمح بتناول هذه العلاجات.

وقال الدكتور سمير شعاعة، أستاذ ورئيس قسم طب الأورام الإكلينيكي بكلية طب جامعة أسيوط، بعد تسجيل راموسيروماب فى مصر تعد الخطوة الثانية فى الدعم القمى لهذا التطور العلاجى وذلك لتحسين جودة حياة المرضى ورفع معدلات البقاء عن طريق تنظيم لقاحات وورش عمل لتتقيد شباب الأخصائيين ومن خلال تضافر الجهود لحشد الأطباء ووزارة الصحة والمنظمات المجتمعية للمشاركة فى هذه اللقاءات ويهد أن كانت العلاجات المعايقة تتطلب حجز المرضى بالمستشفى لتلقى العلاج جاء هذا التحار الموجه ليسمح للمرضى باستكمال حياتهم.



المؤتمر يستعرض فوائد العلاج الجديد لسرطان المعدة

الدولية للأورام: هناك مجموعة مختلفة من الأعراض المصاحبة لسرطان المعدة وعادة ما تكون أعراضاً لا نوعية، ولكن الكشف المبكر مهم للغاية حيث يبلغ معدل بقاء المرضى على قيد الحياة 71% فى المرحلة الأولى من الإصابة بالمرض مقارنة بالمرحلة الثانية التى يبلغ معدل بقاء المرضى فيها 57% فقط.

وأوضح الدكتور هشام الغزالى أن عاملى الخطورة الأساسيين للإصابة بسرطان المعدة هما تاريخ الإصابة بالارتجاع المعدي المريئ والسمنة، وتشمل عوامل الخطورة الأخرى النظام الغذائى الذى يحتوي على الكثير من

الأورام ومدير وحدة الأبحاث فى قسم الأورام بكلية طب جامعة الزقازيق: يعد سرطان المعدة مرضاً شديداً الخطورة، حيث إن معدلات الشفاء أو البقاء بعد التشخيص بالإصابة تعد ضئيلة جداً، وفى مصر إذا قمنا بتطبيق معدلات الإصابة حسب العمر بناء على التعداد السكانى لسنة 2013 والتوقعات المستقبلية الخاصة بزيادة السكان سنجد أن التوقعات تشير إلى زيادة تراكمية فى عدد حالات سرطان المعدة.

وصرح الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية

عقد مؤخراً المؤتمر الدولى لأورام الجهاز الهضمى والكبد وأورام المسالك البولية، الذى يعد إحدى فعاليات الجمعية الدولية لسلاسل، مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع شركة إيللى ليللى للأدوية وتم إطلاق عقار راموسيروماب الذى يعد أول عقار يستخدم كخط أول لعلاج سرطان المعدة يتم اعتماده فى وكالات الدواء الدولية وفى مصر، ونظراً للحاجة الطبية الشديدة لعلاج هؤلاء المرضى وفى ظل خطورة المرض قامت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بتخصيص إجراءات استثنائية لتتجلى بمراجعة الأبحاث العلمية التى تم إجرائها وتم اعتماده، فلما بأن هذه الإجراءات يتم تخصيصها فقط للأدوية التى تتجلى فى علاج الأمراض النادرة التى تقدم قيمة علمية وإكلينيكية كبيرة مقارنة بالعلاجات المتاحة.

وصرح الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ طب الأورام ومدير وحدة الأبحاث فى قسم الأورام بكلية طب جامعة القاهرة: ما زال سرطان المعدة خامس أنواع السرطان الأكثر انتشاراً على مستوى العالم وعلى الرغم من انخفاض إجمالى معدل الوفيات نتيجة انخفاض معدل الإصابة بالمرض، ما زال سرطان المعدة ثالث الأسباب الأكثر انتشاراً للوفاة المبكرة بسبب السرطان على مستوى العالم، ونظراً لخطورة الإصابة بالمرض وارتفاع معدل الوفيات، يسرنا أن نتكلم الآن من منح المرضى خياراً علاجياً جديداً. وقال الدكتور فؤاد أبوطالب أستاذ طب