

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Sharq Al Awsat
DATE:	31-August-2018
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	5,000
TITLE :	New coronary artery, heart failure drugs unveiled at European Society of Cardiology Congress
PAGE:	18
ARTICLE TYPE:	Agency Generated News
REPORTER:	Abdel Hafiz Yehia Khouga
AVE:	20,960

في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب عقاقير جديدة للمصابين بأمراض الشرايين التاجية وفشل القلب



غير المقاوم للعدوى (كيفية) الأكثر انتشاراً، وقد تم التصديق على (7) استحداثات مختلفة لحماية المرضى من إصابات الانصمام الخثاري الوريدي والشرياني، وهذه الاستحداثات هي:

1. الوقاية من السكتة الدماغية لدى المرضى البالغين في حال وجود عامل خطر واحد أو أكثر.
2. علاج الانصمام الرئوي لدى البالغين.
3. علاج الخثار الوريدي العميق لدى البالغين.
4. الوقاية من الإصابة بالخثار الوريدي العميق مرة أخرى لدى البالغين.
5. الوقاية من الجلطات الدموية الوريدية لدى البالغين الذين يخضعون لعملية اختارية لاستبدال السور أو الركبة.
6. الوقاية من تصلب الأوعية الدموية (تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية) بعد متلازمة الشريان التاجي الحاد لدى المرضى البالغين الذين يعانون من علامات حيوية عالية في القلب، وذلك دون تسجيل الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية عابرة عندما يتم وصفه مع حمض أسيتيل الساليسيليك فقط أو مع حمض أسيتيل الساليسيليك بالإضافة إلى كلوبيدوجريل أو تيكلوبيدين.
7. الوقاية من تصلب الشرايين لدى المرضى البالغين المصابين بمرض الشريان التاجي أو مرض الشريان المحيطي والمعرضين لخطر الإصابة الدماغية.

وقدمت في المؤتمر عدة دراسات وتجارب حول فاعلية العقار الجديد، «دراسة «كوماند»» أوضحت المتحدث في المؤتمر، البروفيسور جون كلاند، أن استخدام أسيتل الساليسيليك في جامعة إمبريال كوليدج في لندن المملكة المتحدة، أن ظهور المفاجئ لأعراض قصور القلب

تحتصدهم السرطانات سنوياً، وأنها تتضمن مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية. وأوضح أن أمراض القلب الوعائية الشائعة سواء مرض الشريان التاجي أو مرض الشرايين الطرفية تنجم كلاهما عن تراكم الترسبات في الشرايين (تصلب الشرايين) وقد تؤدي إلى تشكيل جلطات دموية (atherothrombosis). وغالباً لا يكون لتصلب الشرايين أي أعراض في البداية، مما يجعل للشرايين أكثر صلابة وضيقاً، فتحد من إمدادات الدم المحمل بالأكسجين إلى أجزاء من الجسم. ومن مخاطر مرض الشريان التاجي (CAD) أنه قد يؤدي إلى أحداث خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، مما يجعله من أخطر أنواع أمراض القلب. أما مرض الشريان المحيطي (PAD) فيمكن أن يؤدي إلى الغرغرينا ويترافق مع أمراض القلب، والرئة، وأمراض عضلة القلب وغشاء التامور، وأمراض القلب الخلقية، والسكتة الدماغية، وتلفيف الأوعية الدموية الداخلية وجراحة القلب والأوعية الدموية.

ميونيخ (ألمانيا)
د. عبد الحفيظ يحيى خوجرة

أختتمت في مدينة ميونيخ الألمانية مساء الأربعاء الماضي أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC Congress 2018، ويعد هذا المؤتمر أكبر منتدى عالمي للعلماء والأطباء لمواجهة التحديات الطبية التي لا يزال العالم يواجهها.

وشارك في المؤتمر أكثر من 31 ألف طبيب ومختص في الرعاية الصحية من 150 دولة في العالم، وتوقّش أكثر من 4500 من ملصقات الأبحاث الطبية في 500 جلسة علمية. وسيل المؤتمر الضوء على أمراض الشرايين التاجية الحادة، وأمراض الشريان الأورطي والأوعية الدموية الطرفية، والرئة، وأمراض القلب وغشاء التامور، وأمراض القلب الخلقية، والسكتة الدماغية، وتلفيف الأوعية الدموية الداخلية وجراحة القلب والأوعية الدموية.

أهم أمراض القلب

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، بما في ذلك مرض الشريان التاجي (CAD) ومرض الشريان المحيطي (PAD)، من أكثر أمراض القلب شيوعاً وخطورة. وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية WHO، وتقدر أعداد المصابين بالشريان المحيطي وحده بنحو 202 مليون شخص حول العالم.

التقت «صحته» بأحد المتحدثين في المؤتمر البروفيسور مارتن كاوي الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج - لندن ومستشفى فخري لأمراض القلب بمستشفى بروميون الملكي - المملكة المتحدة، الذي أفاد بأن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، كما أنها سبب للوفاة المبكرة عالمياً وتقلض ضعف عدد الأشخاص الذين

تحدث إلى «صحته» الدكتور فرانك ميسلويتز Dr. Frank Misselwitz أحد المتحدثين في المؤتمر، رئيس قسم التطوير السريري لأمراض القلب والأوعية الدموية - باير - فأوضح أن صحة القلب تواجه تحديات مختلفة، ومن أهمها عدم فهم الجمهور لأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار إلى مسج تم إجراؤه بين عامة الناس في سبع دول (المملكة المتحدة والمانيا وبولندا وكندا والمكسيك والبرازيل والهند والصين والسويد والنرويج)، شمل ألف مشارك من كل دولة، بهدف جمع المعلومات حول المستوى الحالي لفهم مرض الأوعية الدموية، بما في ذلك CAD وPAD، ولتحديد الفجوات في المعرفة لديهم، إن وجدت. تم استخدام استبيان مدته 8 دقائق.

أظهرت النتائج أن أكثر من 80% من الناس غير ملمين بأمراض الشريان التاجي، أكثر من 90% منهم غير ملمين بأمراض الشرايين الطرفية، الحادة، أكثر من 75% غير ملمين بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما وجد أن 76% في المائة تمكنوا من ربط مرض الشريان التاجي

عقار جديد

واصل الدكتور فرانك حديثه بأن مرضي القلب والشرايين يتلقون حتى الآن علاجاً للخطر الدموي المضاد للتصلب، ولا يعد هذا العلاج كافياً بشكل عام، لأن معدلات الإصابة بهذه الأمراض تظل مرتفعة، وبالتالي، فإن هناك حاجة لتحسين النتائج من خلال ابتكار علاجات جديدة أو إضافية تعزز القدرة على الحد من خطر الإصابة القلبية الخطيرة الرئيسية لدى مرضى تصلب الشرايين. ويعد ريفاروكسيبان (rivaroxaban) مضاد التخثر «فموي» الأول والوحيد من نوعه غير المقاوم للعدوى (كيفية) والذي

مضادات التخثر

تعد الأدوية المضادة للتخثر وسائل فعالة للوقاية ولعلاج الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الأشخاص. ويعد ريفاروكسيبان مضاد التخثر «فموي» من نوعه غير المقاوم للعدوى (كيفية) والذي

* استشاري طب المجتمع