

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq supplement
DATE:	05-December-2021
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	50,000
TITLE:	Novartis offers new hope to metastatic breast cancer patients in Egypt
PAGE:	04
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	21,000

«نوفارتس» تمنح بارقة أمل جديدة لمريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم في مصر



جانب من مؤتمر «نوفارتس»

المرضى العمرية، وأضاف: «إن زيادة معدل البقاء على قيد الحياة وتحسين جودة حياة مريضة السرطان يمثل أحد أهم أولويات نوفارتس، حيث تتلخص رؤيتنا في صياغة عالم جديد يصبح فيه سرطان الثدي المتقدم مرضاً يمكن السيطرة عليه، وهو ما يواصل برنامج MONALEESA الهرموني المتقدم. وتمثل نتائج هذه الدراسة السريرية التي شاركها معكم اليوم أملاً واعداً وغير مسبوق للمريضات ملحوظة في معدل البقاء على قيد الحياة لأكثر من خمس سنوات عند استخدامه مع علاج هورموني.»

معدل بقائهن على قيد الحياة». وأوضح أن: «زيادة معدل البقاء على قيد الحياة يمنح المريضات فرصة ثمينة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهن وأحبائهن وتحقيق آمالهن في الحياة، حيث وصل هذا المعدل مع عقار ريبوسيكليب لأطول فترة تم تسجيلها ومتابعتها لمريضات سرطان الثدي المتقدم HR+/HER2-، ولذلك فإن هذا العلاج يمثل أملاً حقيقياً للمريضات حيث يعزز من جودة حياتهن ويمنحهن ممارسة الحياة بصورة طبيعية بدلاً من آلام العلاج الكيماوي.»

في سياق متصل، قال الدكتور شريف أمين، مدير عام قطاع الأورام بشركة نوفارتس فارما (مصريونوس - المغرب)، بأن هذه الدراسة تأتي في إطار التزام شركة نوفارتس تجاه مرضاها حيث إن هذه الأبحاث تسعى لتطوير عقار ريبوسيكليب، لدعم مريضات سرطان الثدي، بهدف تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع فئات

أعلنت شركة نوفارتس فارما مصر عن النتائج النهائية لبيانات تحسن معدل البقاء على قيد الحياة للمرحلة الثالثة من دراسة MONALEESA-2 لتقييم استخدام عقار ريبوسيكليب مع ليتروزول لعلاج مريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث والذين لم يسبق لهن الحصول على علاج شامل لسرطان الثدي المتقدم. من جانبه قال حمدي عبدالعظيم - أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة: إن التحليل النهائي لبيانات دراسة MONALEESA-2 لتقييم استخدام عقار ريبوسيكليب مع ليتروزول كخط علاج أول لسرطان الثدي المتقدم، إلى أن مريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم اللاتي تلقين العقارين معاً في إطار هذه الدراسة لديهن فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى ٢٠٪ بعد خمس سنوات، وهو ما يمثل بارقة أمل حقيقية للمريضات، خاصة بعد أن تمكن ريبوسيكليب من تحقيق أعلى معدل للبقاء على قيد الحياة تم تسجيله في دراسة سريرية لسرطان الثدي المتقدم HR+/HER2- حتى الآن. من ناحية أخرى استطاع ريبوسيكليب تأخير تلقى المريضات للعلاج الكيماوي لمدة ١٢ شهراً (بمتوسط ٥٠،٦ شهر مقابل ٢٨،٩ شهر)، مقارنة بالمريضات اللاتي تلقين عقار ليتروزول وحده. وتعد هذه الزيادة الملحوظة في معدل الحياة المتوقعة مع المحافظة على جودة الحياة، بشري سارة لمريضات سرطان الثدي المتقدم.

ألفت الأستاذة الدكتورة هبة الظواهري - أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام الضوء على نتائج الدراسة بقولها: «إن الهدف الرئيسي من علاج أي نوع من أنواع السرطان المتقدم هو إبطاء سرعة انتشار المرض والسيطرة عليه ومساعدة المرضى على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وأطول فترة ممكنة. لقد شهدت السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في طرق إدارة وعلاج سرطان الثدي، حيث أصبح هناك تركيز كبير على العلاجات الموجهة التي تلبي الاحتياجات العلاجية للمصابات بأنواع مختلفة من هذا المرض، وتحسين