



## **PRESS CLIPPING SHEET**

PUBLICATION:	Al Shorouq
DATE:	11-February-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE :	Medical warnings: HCV can mutate with any drug taken
	individually
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Government News
REPORTER:	Asmaa Sorour



## کتبت۔ أسماء سرور:

حدر الدكتور حسنى سلامة، أستاذ أمراض الكيد بجامعة القاهرة، مرضى الكيد من أخذ أى دواء للكيد منفردا، لأن ذلك قد يؤدى إلى تحور الفيروس وعدم استجابته للعلاج وصعوبة العلاج، وأضاف سلامة، خلال كلمته بمنتدى الكيد الدولى الأول الذى عقد أمس، بالقاهرة، إلى أن شركات الأدوية تقوم حاليا بإنتاج كبسولات أو حبوب جديدة تحوى كل منها أكثر من عقار بهدف زيادة فاعلية الدواء.

وأضاف أن عقار زيباتير الذى اعتمدته هيئة الدواء الأمريكية أخيرا لعلاج فيروس «سى» يحتوى على عقارين

فى قرص واحد وهو قريب من عقار الكيوريفو فى التركيب الدوائى ويؤخذ لدة ٣ أشهور.

وأوضح أن هذا العقار يصلح للنوع الجينى الأول بنسب شفاء تتراوح من ٩٤٪ إلى ٩٧٪، بينما فى النوع الجينى الرابع فقد تصل إلى ١٠٠٪، كما يصلح لمرضى قصور الكلى ومرضى التليف.

وقال دحمد عز العرب استشارى الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن احتمالية تحور الفيروس تزداد فى بعض الأدوية الجديدة لأنها تحتوى على مادة قد تتسبب فى زيادة تكاثر الفيروس، إذا تم أخذها بشكل فردى.