

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	03-Oct-2017
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	49,000
TITLE :	Gastric cancer, the silent killer
PAGE:	09
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	3,500

سرطان المعدة القاتل الصامت

أعلن الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس، أن سرطان المعدة رغم خطورته إلا أنه يصعب اكتشافه مبكراً نظراً لأن أعراضه تتشابه مع أمراض أخرى كعسر الهضم أو قرحة المعدة، وقد تشمل الأعراض المصاحبة والشعور بالانتفاخ بعد الأكل، والحرقنة الشديدة والمستمرة في فم المعدة، وعسر الهضم الشديد، والغثيان المستمر بدون سبب، وآلام المعدة، والقيء المستمر، وخسارة الوزن ومن المهم اكتشاف المرض مبكراً حيث يبلغ معدل بقاء المرضى على قيد الحياة ٧١٪ في المرحلة الأولى من الإصابة بالمرض، مقارنة بالمرحلة الثانية التي يبلغ معدل بقاء المرضى فيها ٥٧٪ فقط.

ويضيف الدكتور هشام الغزالي أن هناك عوامل تزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة ومنها النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الملح والطعام المدخن، والسمنة، والتدخين، وتناول كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات وتناول

الطعام الذي يحتوي على فطر ألفاتوكسين، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة، والتهاب المعدة طويل المدى، وفقر الدم الخبيث، والتهاب المعدة السليبي، والإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.

وأوضح الدكتور نيلز هومان مدير القسم الطبي الثاني في مستشفى فولفسبورج الألمانية، بجامعة هانوفر الطبية أن عقار رامبوسيروماب المعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، يتم استخدامه كعلاج أحادي أو ثنائي مع عقار باكليتاكسيل، والذي اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية. مشيراً إلى أن هذا العقار لا يعتبر علاجاً كيميائياً ولكنه من العلاجات الموجهة الحديثة التي تعمل على تثبيط نمو الأوعية الدموية المغذية للورم وبالتالي منع أو الحد من نموه وانتشاره جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتعاون مع المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد وأورام المسالك البولية، والذي يعد إحدى فعاليات الجمعية الدولية للأورام.

