

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	5-November-2012
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	165,000
TITLE :	Liver cancer infection at a rise in Egypt.
PAGE:	12
ARTICLE TYPE:	Agency Generated
REPORTER:	Staff Reporter
AVE:	10,395

الاصابة بسرطان الكبد تتزايد في مصر

فعالية هذه الوسيلة باستخدام أقراص العلاج الطبي الموجه التي تؤخذ عن طريق الفم وبدأ بالفعل تطبيق هذا الخط من العلاج باستخدام الوسيطتين معاً. وأوضح الدكتور محمد كمال شاكر، أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد، جامعة عين شمس، أن الكشف عن سرطان الكبد يتم حالياً في ٩ مراكز علاج بالانترفيرون. وتهدف الجمعية إلى إطلاق الكشف المبكر في إجمالي ٢٣ مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على الكشف عن المرض وتسجيل النتائج على قاعدة بيانات مركزية. وتأكيداً على أهمية القواعد الإرشادية للعلاج، قال الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد: «تم وضع الخطوط الإرشادية المصرية لعلاج أورام الكبد الأولى، التي تتضمن سبل الوقاية والكشف المبكر والتشخيص وتحديد مرحلة المرض، ومن ثم وضع الطريقة المناسبة للعلاج سواء جراحياً أو عن طريق الأشعة التداخلية، أو الطريق الدوائي».

التشخيصية ورئيس وحدة الأشعة التداخلية، جامعة عين شمس، ورئيس جمعية سرطان الكبد المصرية عن تطور آخر في خيارات العلاج، حيث تم في الآونة الأخيرة تصنيع حبيبات مشعة متناهية في الصغر يمكن حقنها داخل الورم مباشرة وتبدأ في إصدار الأشعة القاتلة للخلايا الورمية دون تأثير كبير على خلايا الكبد المحيطة واعتمدت هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية حديثاً هذه الوسيلة لعلاج سرطان الكبد الأولي. ونجح الفريق العلمي لجمعية سرطان الكبد المصرية في إدخال هذه الوسيلة واستخدامها في علاج المرضى للسيطرة على الأورام المتقدمة التي كان يصعب التعامل معها بالوسائل الأخرى.. وهناك اتجاه عالمي لزيادة

يعد نقطة تحول في مسار علاج سرطان الكبد وساعد هذا الاكتشاف لأول مرة على التوصل إلى دليل قاطع على قدرة العلاج في زيادة فرص إعاشة مريض سرطان الكبد المتقدم. واعتمدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقاراً جديداً لعلاج سرطان الكبد. ويساعد العلاج الموجه الذي يطلق عليه ميثيل بروتين الـ kinase على وقف نمو الخلايا السرطانية، وشارك أكثر من ٦٠٠ مريض بسرطان الكبد المتقدم في دراسة sharp الإكلينيكية التي أثبتت نجاح العقار في زيادة معدل إعاشة المريض لمدة عام تقريباً في ٢١٪ من الحالات كما نجح العقار الجديد في مقاومة تطور المرض في ٤٢٪ من الحالات. وأعلن الدكتور أحمد الدري، أستاذ الأشعة

الكبد الوياتي «سي»، المسئول عن نسبة كبيرة من حالات سرطان الكبد، والالتهاب الكبدي الوبائي «بي» والتعرض للتسمم الغذائي بفطر الأفلاتوكسين، وتناول الكحول بشكل مزمن. وتعتمد خيارات علاج سرطان الكبد على مرحلة المرض، ووظائف الكبد، والحالة العامة للمريض، وتشمل: الجراحة، والأشعة، وعلاجات السرطان، وحقن الأيثانول عن طريق الجلد. وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ ورئيس قسم الأورام، جامعة القاهرة، أن اكتشاف بروتينات raf kinase، والتي توجد في ٨٠-٦٠٪ من حالات سرطان الكبد، ودورها في تحفيز الخلايا السرطانية على النمو أو المساعدة على تكوين أوعية دموية جديدة،

عقبت جمعية سرطان الكبد المصرية مؤتمراً صحفياً تحت عنوان «سرطان الكبد: الحاضر والمستقبل» استعرض المشاركون فيه التطورات في مجال علاج سرطان الكبد، السبب الرئيسي الثالث للوفاة بالسرطان على مستوى العالم، وأحدث نتائج الدراسات العلمية الخاصة بالعلاج الموجه التي كشفت لأول مرة عن الأمل في زيادة فرص إعاشة المرضى، كما ألقى المؤتمر الضوء على القواعد الإرشادية للعلاج. صرح الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، بأن معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر شهدت ارتفاعاً مخيفاً، حيث سجلت الزيادة خلال الـ ١٢ عاماً الماضية، فبعد أن سجلت ٤٪ فقط في ١٩٩٢، بلغت ٨.٥٪ في ٢٠٠٥، ويصيب سرطان الكبد في مصر من ٥ إلى ٧ أشخاص بين كل ١٠٠ ألف سنوياً، ويسبب الوفاة لـ ٦ أشخاص من كل ١٠٠ ألف، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن المرض، ومن أهم عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب