

PRESS CLIPPING SHEET


PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	5-April-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Adverse Reactions if Sovaldi Taken alongside Amdiodarone
PAGE:	20
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر مرضى فيروس «سى» والقلب

مضاعفات جانبية لتناول «سوفالدي و أميودارون» معا

يظهر أعراض جانبية حادة من تفاعل سوفوسوفير مع دواء أميودارون المنظم لضربات القلب فإنه من المهم تنبيه الأطباء بشكل دوري وهو ما يتم بالفعل عبر مراكز علاج فيروس سى أو حتى عبر مركز اليقظة الصيدلانية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة حيث من المستهدف تعريف الأطباء بصورة دورية بالدراسات والتحذيرات العالمية من التفاعلات السلبية بين الأدوية لتجنب أى مضاعفات قد تحدث للمرضى خاصة وأنه مع طرح التجارى ليدائل سوفالدي بالصيدليات وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للطبيب المعالج لحالة المريض. كما قامت جامعة كامبريدج بتخصيص موقع لجمع ورصد كافة التفاعلات بين أدوية علاج فيروس سى والأدوية الأخرى لتحديد مدى مخاطر الآثار الجانبية للتفاعلات بين الأدوية وتنبيه الأطباء والمرضى بمضاعفات تناول أكثر من دواء فى ذات الوقت لعلاج أكثر من مرض. والموقع هو www.hep-druginteractions.org

من ناحية أخرى أوضح د. إمام وأكد أنه من المتوقع خلال الشهور المقبلة مع اعتماد أدوية أخرى جديدة لعلاج فيروس سى أن تتوافر فى مصر بدائل علاجية غير السوفالدي خاصة للحالات التى تعاني من أمراض أخرى مثل اضطراب نبضات القلب كما من المرتقب خلال منتصف إبريل أن يتم الإعلان عن نتائج تعافى المرضى المصريين وذلك بعد مرور ٣ شهور على انتهاء برنامج العلاج بدواء سوفالدي.



حيث يتم استبعاد الحالات التى تعاني من الذبذبة الأذينية أو مضاعفات بالقلب كما يتم أيضا استبعاد حالات فيروس سى التى تتناول أدوية لعلاج الصرع أو أدوية علاج الكولسترول حرصا على سلامة المريض من المضاعفات الجانبية لتفاعل الأدوية.

وفيما يتعلق بتحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فإن هذا الأمر جاء بعد طرح التجارى للدواء وحصول مئات الآلاف من المرضى على علاج سوفالدي أو هارفونى حيث كلاهما بهما نفس المادة الفعالة سوفوسوفير. وبالتالي فإنه

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فى بيان لها نشر مؤخرا من مضاعفات تناول علاج سوفالدي أو هارفونى لمرضى فيروس سى الذين يعانون اختلالا بنبضات القلب ويعالجون بدواء أميودارون المنظم لضربات القلب، حيث أظهرت التقارير حدوث تفاعل سلبي ما بين الدوائين يؤدي لحدوث هبوط حاد بنبضات القلب.

وطبقا للتقارير الدولية فلقد تم رصد ٩ حالات حدث لها مضاعفات سلبية منهم حالة تعرضت للوفاة وحالات تطلب الأمر تركيب منظم لضربات القلب كما تم رصد مضاعفات لخمس حالات بأوروبا لنفس السبب. ويقول د. محمد نصر أستاذ طب وجراحة القلب بمعهد القلب القومى إن دواء أميودارون المنظم لضربات القلب برغم كونه من أكثر الأدوية نجاحا وفعالية إلا أنه يسبب مضاعفات صحية جانبية على الكبد والغدة الدرقية خاصة إذا تم تناول العلاج لأكثر من ٦ أشهر وبشكل عام فإن مرضى فيروس سى لا يمكنهم الحصول على العلاجات الدوائية الجديدة دون الحصول على تقرير طبي يؤكد سلامة حالة القلب مما يحد من حدوث المضاعفات التى تناولتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويقول د. إمام وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومى وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إنه بشكل مسبق فلقد راعينا قبل منح أدوية الكبد الجديدة أن تكون ضمن التقارير والتحليلات المسبقة للعلاج تقرير طبي عن حالة قلب المريض



PRESS CLIPPING SHEET