

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	2-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE :	MoH treatment has led to a 35% relapse rate in HCV patients
PAGE:	13
ARTICLE TYPE:	Government News
REPORTER:	Ahmed Waddeh

علاج وزارة الصحة أدى لانتكاسة ٣٥% من مرضى فيروس «C»

لـ ٣٠% من المرضى وأصدروا بيانات بتلافي هذا البروتوكول. وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه كان يتعين على وزارة الصحة الانتظار حتى يتم اعتماد بروتوكول «هارفوني»، وسوفالدي، وأوليسوا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نسبة من ١٥ إلى ٢٥% يتم شفاؤهم بدون علاج تلقائياً، من خلال المناعة الجسمانية لديهم.

عبر فضائية «العاصمة»، أن بروتوكول العلاج الثنائي ريبافارين سوفالدي، لمدة ٦ أشهر كارثي وأدى إلى حدوث انتكاسة للمرضى بعد العلاج وبعد أشهر يعود الفيروس بالتضاعف، لافتاً إلى أن البروتوكول الثلاثي «سوفالدي، وريبافارين، وانترفيرون» أكدت دراسة أمريكية أجريت على ٥٧٠ حالة أنه تسبب في الانتكاسة

كتب - أحمد واضح، أكد الدكتور محيي عبيد - نقيب الصيادلة - أن بروتوكولات علاج فيروس سي، التي تستخدمها وزارة الصحة حالياً خاطئة، وتسبب في انتكاسة ٣٥% من المرضى. وأوضح «عبيد»، خلال حوار مع الإعلامى سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع