


PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef
DATE:	11-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	40,000
TITLE :	MoH: We are seeking to make the MRSA antibacterial available
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Mahmoud Gouda

PRESS CLIPPING SHEET



الصحة: نسعى لتوفير عقار مضاد للبيكتيريا العنقودية «ميرسا»

كتب - محمود جودة

الحبوبة في المنشآت الصحية والمجتمع، بالإضافة إلى عدم الالتزام باحتياطات مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم ١٩ مليوناً و٣١١ ألفاً و١٥٩ طفلاً بجميع محافظات الجمهورية خلال ١١ يوماً من إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية. وتستهدف الحملة تطعيم ٢٤ مليون طفل من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التقرير النهائي الذي تلقته من المستشفى التخصصي بالإسماعيلية التابعة لجامعة قناة السويس يؤكد إصابة الدكتورة داليا محرز بالتهاب سحائي صديدي غير وبائي، كما أن الحالة لم تكن مستقرة ولم يتمكن المستشفى من نقلها إلى مستشفى الحميات.. حيث كانت على جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة وكانت تتناول أدوية منشطة للضغط والقلب، وحدث هبوط حاد بالدورة الدموية لها وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب وحدثت الوفاة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/٥.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها اتخذت جميع الإجراءات تجاه توفير عقار الفانكوميسين الفعال ضد البيكتيريا «ميرسا» بكميات مناسبة، وأن هذه البيكتيريا موجودة في مختلف دول العالم ومنها «الولايات المتحدة الأمريكية»، وألمانيا والصين وإيران والإمارات العربية المتحدة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للوزارة بأنها لا تمتلك إحصائيات حول بكتيريا «ميرسا» عار تماماً من الصحة وأن الوزارة قامت بإجراء دراسة عن حجم المشكلة في عام ٢٠١٢ لتقدير معدل انتشار بكتيريا «ميرسا» في عدد ٢٠ وحدة رعاية مركزة بسبع محافظات من محافظات الجمهورية، وتم أخذ (٢٩٠) عينة من المرضى وتبين أن نسبة العينات الإيجابية كانت ٧,٩٪ من مجموع العينات.

وأن العدوى بهذا الميكروب تكون في الغالب بين المرضى ضعيفي المناعة وخاصة مرضى العناية المركزة، وأنها تنتقل عن طريق الرذاذ والتلامس، وأن أهم أسباب انتشارها الاستخدام غير الصحيح للمضادات