

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Nisf Al Donia
DATE:	22-February-2019
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	12,000
TITLE :	New breast cancer treatment discovered. MoH approves first medicament for advanced breast cancer patients under the age of 45
PAGE:	Front Cover, 38
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	10,000

PRESS CLIPPING SHEET



نصف الدنيا

NISF ELDUNIA MAGAZINE
nisfeldunia.ahram.org.eg
العدد رقم 1515
22 فبراير 2019

مع أميرة
البطليخة تصبح
الموناليزا !

كتابك ديليفري
حتى باب بيتك

الطفل الأوسط
أكثر عناءا
وعصبية

اكتشاف علاج
جديد لسرطان
الثدي

«قصة حب» في
نصف الدنيا

المرأة و ثورة 1919
مئة عام
من النضال
ملحق مجاني

00112

PRESS CLIPPING SHEET



وزارة الصحة تعتمد أول علاج لمرضى سرطان الثدي المتقدم تحت سن 45

على هامش المؤتمر الدولي الحادي عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي للأورام تم عرض نتائج دراسة «موناليزا-V»، وهي أول دراسة تستهدف المصابات بسرطان الثدي المتقدم قبل أو قرب انقطاع الطمث، للتحقق من فعالية وسلامة عقار «ريبوسكليب». وقد اعتمدت وزارة الصحة المصرية العقار وأتاحت استخدامه للمرضى تحت سن 45، وهم الفئة الأكثر إنتاجاً في المجتمع، طبقاً لنتائج الدراسة. وجدير بالذكر أن قوة نتائج الدراسة وأهميتها سوف تتيح لأطباء علاج الأورام ومرضى سرطان الثدي المتقدم خياراً علاجياً جديداً خاصة لمن لم يتجاوزوا سن 45 عاماً، فلم تعد اختياراتهم تقتصر على العلاج الهرموني والكيميائي فقط.

أعرب عن شعورهم وحدهم بأعراض المرض.

كما أوضح أ.د. الغزالي: حسب النتائج وطبقاً لاستبيان الرأي البحثي الذي تم إجراؤه على مرضى سرطان الثدي المتقدم، فإن حوالي ثلاثة أرباع السيدات المصابات 76% يعتقدن أن خياراتهن محدودة وهناك حاجة ماسة لتطوير علاجات جديدة. وبعد العلاج الهرموني مع إخماد المبيض أو استئصاله هو العلاج القياسي للسيدات قبل أو قرب انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم (HR+/HER2-) ومع ذلك، فإن مقاومة العلاج الهرموني وتقدم المرض يحدث في معظم الحالات، وبعد استئصال المبيض خديراً كبيراً يواجه المريض في عمر الشباب لأنه يحرمهم من الإنجاب بعد العلاج.

ويستطرد: قبل دراسة موناليزا-V، كانت التجارب الإكلينيكية التي أجريت على العلاج الموجه المشترك والقياسي لمرضى سرطان الثدي المتقدم الإيجابي لمستقبل الهرمون. قد ضمت عدداً من السيدات بعد انقطاع الطمث، وبناءً على ذلك، فقد استُهدت توصيات العلاج للسيدات قبل انقطاع الطمث من دراسات أجريت على السيدات بعد انقطاع الطمث، والتي افترضت أن نتائج العلاج ستكون مشابهة. دون دليل قاطع على ذلك، وفي ظل غياب الأدلة الإكلينيكية، يتم وصف العلاج الكيميائي كعلاج قياسي لنسبة كبيرة من السيدات المصابة بسرطان الثدي المتقدم HR+/HER2- اللاتي لم يبلغن 50 عاماً. ولذلك، كانت هناك حاجة ملحة لتجارب مخصصة للسيدات قبل انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي، لتحديد فعالية وسلامة العلاجات المشتركة لهذه الفئة من المرضى.

من جانبه، بيّن أ.د. حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني نعد موناليزا-V أول دراسة تستهدف السيدات المصابة بسرطان الثدي المتقدم HR+/HER2- قبل أو قرب انقطاع الطمث، للتحقق من فعالية وسلامة عقار «ريبوسكليب» بالاشتراك مع مثبط أروماتاز. كما استهدفت الدراسة السيدات اللاتي لم يحصلن سابقاً على العلاج الهرموني لمرض متقدم، وكان أكثر من 670 سيدة في الفئة العمرية من 25 إلى 58 عاماً قد تم توزيعهن عشوائياً في دراسة موناليزا-V.

يقول أ.د. علاء قنديل، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب، جامعة الإسكندرية: «اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقار «ريبوسكليب»، كما اعتمدته وزارة الصحة المصرية وأتاحت استخدامه باعتباره مثبط CDK4/6 الوحيد الذي يتم وصفه بالاشتراك مع مثبط أروماتاز كعلاج قياسي للسيدات قبل وقرب انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم (HR+/HER2-)».

وأضاف: «أغلبية مريضات سرطان الثدي المتقدم تتراوح أعمارهن حول سن 45 عاماً، وكانت خياراتهن العلاجية محدودة، ولذلك يمثل الدواء الجديد تطوراً علاجياً لأنه يعالج الفئة الأكثر إنتاجاً من السيدات، سواء أمهات وريبات نيوت أو موظفات في سوق العمل. فيساعد الدواء الجديد هذه الفئة على متابعة حياتها بصورة شبيهة طبيعية مع أعراض جانبية بسيطة، وهو الخيار الذي لم يكن متاحاً من قبل، وهو الخبر الجيد والمبشر بالأمل لهن».

وتابع قنديل: لقد جاءت تسمية دراسة موناليزا بهذا الاسم لأنه يشاع أن صاحبة الصورة كانت عمرها 37 عاماً آنذاك، وهو ما تركز عليه الدراسة لمُنع المريضات في هذه السن خياراً علاجياً جديداً وميزاً.

وتابع: في الشرق الأوسط، تشير التقديرات إلى أن نسبة مرضى سرطان الثدي تحت سن 50 عاماً تبلغ 50%، وعادة ما يتم تشخيص السيدات الشابة في مراحل متقدمة من الإصابة بالأورام، حيث تكون غالبية السيدات تحت سن 45 عاماً في المرحلة الثالثة من المرض، ومصابة بنقائل عقدية وأورام ثدي أكبر، ويُدر الإشارة إلى أن سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث يعد مرضاً مختلفاً بيولوجياً وأكثر عدائية من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وهو السبب الأساسي في الوفاة الناجمة عن الإصابة بسرطان في السيدات بالفئة العمرية 20-59.

ويقول أ.د. هشام الغزالي، أستاذ الأورام بكلية الطب، جامعة عين شمس: «يمثل التشخيص في عمر مبكر خديراً نفسياً وعاطفياً فريداً من نوعه، بما يشمل التعامل مع الزوج والأولاد، وشكل الجسم، والقدرة الجنسية، وفقدان الخصوبة - انقطاع الطمث المبكر، وطبقاً لاستبيان الرأي البحثي الذي تم إجراؤه على 68 مريضة بسرطان الثدي المتقدم في مصر، فإن حوالي ثلثي السيدات 67% أعربن عن إحساسهن بالعزلة عن المرضى غير المصابات بسرطان الثدي المتقدم، كما