

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Radio & Television magazine
DATE:	18-December-2021
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	20,000
TITLE:	MONALEESA-2 gives ray of hope to advanced breast cancer patients
PAGE:	76
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	3,000

موناليزا 2 تمنح بارقة أمل لمريضات سرطان الثدي المتقدم

لهن فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50% بعد خمس سنوات، وهو يمثل بارقة أمل حقيقية، خاصة بعد أن تمكن هذا العقار من تأخير تلقي المريضات للعلاج الكيماوي لمدة 12 شهرا بمتوسط 6-7 شهرا مقابل 28,9 شهرا. مقارنة بالمريضات اللاتي تلقين عقار لبيترزول وحده. وتعد هذه الزيادة في معدل الحياة المتوقعة مع المحافظة على جودة الحياة. بشرى سارة لهؤلاء المرضى، كما تمثل خطوة بالغة الأهمية تنبئ بتحقيق المزيد من التقدم في مستقبل علاج هذا المرض.

وأكد الدكتور أحمد حسن أستاذ مساعد علاج الأورام بكلية طب عين شمس وعضو البرنامج القومي لصحة المرأة أن برنامج موناليزا يواصل لعب دورا هاما في تغيير طرق وأساليب علاج سرطان الثدي المتقدم، حيث أثبت البرنامج درجة عالية من التوافق في نتائج الدراسة، وأوضح.. أنه في إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة أطلقت وزارة الصحة المصرية بروتوكولات علاجية جديدة لسرطان الثدي المتقدم يعتمد على أفضل العقاقير المبتكرة لعلاج السرطان في مصر، وهو ما يمثل علامة فارقة في علاج هذا المرض.



مقياسا هاما لتحديد مدى فعالية العقاقير أو الأساليب العلاجية الجديدة، ونناقش اليوم النتائج الخاصة بمعدل البقاء على قيد الحياة لعقار ريبوسيكليب في المرحلة الثالثة من دراسة موناليزا بعد 6 سنوات ونصف السنة من المتابعة، وهي أطول فترة لآلية تجربة سريرية تم تسجيلها حتى الآن لعقار ينتمي لمضطبات أنزيم 4/6 سي دي.. ومن المتوقع أن تغير هذه المرحلة من الأساليب التقليدية لعلاج سرطان الثدي المتقدم.

ويضيف الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.. أن التحليل النهائي لبيانات دراسة موناليزا 2 يقيم عقار ريبوسيكليب مع لبيترزول. كخط علاجي أول لسرطان الثدي المتقدم، حيث إن المريضات اللاتي تلقين العقارين معا في إطار هذه الدراسة كانت

جودة الحياة هدف مقدس تسعى إليه الدراسات والأبحاث الحديثة من أجل تغيير طرق وأساليب علاج مريضات سرطان الثدي خلال رحلة علاجهن، وهذا ما توصلت إليه بالفعل المرحلة الثالثة من دراسة موناليزا 2، وأعلنت عنه إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات فرع مصر خلال مؤتمر صحفي لتقييم استخدام عقار جديد لعلاج مريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، والذي لم يسبق لهن الحصول على علاج شامل لهذا المرض.

يقول الدكتور علاء فنديل أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.. يعد سرطان الثدي من أكثر الأنواع انتشارا بين السيدات في مصر، حيث يصيب 43% منهن، ويمكن انتشاره في أماكن أخرى من الجسم مثل الرئتين، أو الكبد، أو العظام، والمخ. وأضاف.. أن معدل البقاء على قيد الحياة يمثل الهدف الرئيسي الذي يسعى كل من المريض وطبيب الأورام للوصول إليه عند علاج هذا المرض، وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يعيشها المرضى بعد تشخيص إصابتهم بالسرطان للمرة الأولى أو بعد بداية تلقيهم للعلاج، ولذلك يعد