

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar
DATE:	17-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Boehringer Ingelheim launches its first treatment for type 2 diabetes in the Egyptian market
PAGE:	21
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	Staff Report

شركة «بوهرنجر إنجلهايم» تطرح أولى علاجاتها لمرض السكري من النوع الثاني في الأسواق المصرية

لدوة خاصة عن الاتجاهات الجديدة لإدارة مرض السكري من النوع الثاني بالمرافق مع إطلاق الدواء الأول الخاص بمواجهة المرض



نظمت شركة «بوهرنجر إنجلهايم» الشركة الرائدة في مجال صناعة المستحضرات الدوائية، جلسة علمية حضرها أكثر من 500 طبيب من كافة أنحاء مصر من بينهم أطباء متخصصون في الغدد الصماء، وآخرون متخصصون في الطب الباطني والرعاية الأولية، وذلك بهدف إطلاق العقار الجديد المثبط لإنزيم البيبتيداز ثنائي البيبتيد (DPP-4) للمرضى المصابين بالنوع الثاني من السكري في مصر.

بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد السحار، مدير شركة «بوهرنجر إنجلهايم» في مصر: «نحن، في شركة «بوهرنجر إنجلهايم»، نؤمن بأهمية الاستثمار في الأبحاث والتنمية؛ حيث نهدف في المقام الأول إلى توفير منهج مبتكر للتعامل مع النوع الثاني من مرض السكري، وذلك وفقاً بالتزامنا في تلبية الحاجات المختلفة للمرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني. فمن خلال الأبحاث والتعاون، أثمرت جهودنا نطاقاً واسعاً من المستحضرات العلاجية وإصراراً مستمراً على توفير الحلول الملائمة لمرض السكري من النوع الثاني في مصر. ولن يتأتى ذلك من خلال توفير العلاجات بحسب، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع الحكومة، والمؤسسات، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لخدمة المرضى وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة».

وحسبما جاء في إحصائيات الاتحاد الدولي لمرض السكري، يوجد أكثر من 35.4 مليون حالة إصابة بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، من بينهم 7.8 مليون حالة إصابة في مصر. كما اكتشف الاتحاد الدولي لمرض السكري في نفس العام وجود 78,184 حالة وفاة في مصر ناجمة عن الإصابة بهذا المرض. ومن جانبه، قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لمرض السكري والغدد الصماء: «يمثل ارتفاع معدلات الإصابة بالنوع الثاني من السكري في المنطقة مصدر قلق بالغ؛ حيث لا تقتصر مضاعفاته على الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بأمراض الكلى أو أمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تمتد تأثيراته السلبية لتشمل المجتمع بأسره بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق على وسائل العلاج. ويخروج عقار «لينأجلتين» المثبط لإنزيم البيبتيداز ثنائي البيبتيد (DPP-4) والمستحدث لعلاج البالغين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري عبر الصقراء والقناة الهضمية وليس عبر الإخراج الكلوي ولا يتم استقلابه في الكبد. وتسمح هذه الميزة باستخدام الدواء حتى في الحالات التي يعاني فيها المرضى من الفشل الكلوي أو الكبد، بينما لا يمكن استخدام العلاجات التقليدية مع هؤلاء المرضى دون الخضوع لمراقبة، تغيير أو تنظيم الجرعة اليومية. الأدوية الجديدة هي وصفات طبية ولا يمكن تناولها دون إذن الطبيب المعالج.