

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	17-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	Gaucher's Disease destroys the liver and spleen
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Staff Report

بين وزارة الصحة والسكان وبرنامج لدعم مرضى جوشية
الخميس ١٢ مايو ٢٠١٦

«مرض جوشية» يدمر الكبد والطحال

وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكولا للتعاون المشترك من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجال دعم مرضى جوشية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض المصري. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان خلال توقيع بروتوكول التعاون إن مرض جوشية يشكل عبئا كبيرا ماديا ومعنويا على المريض كما أن عدد المرضى في ازدياد مستمر مما يشكل أعباء اجتماعية واقتصادية على حياة المرضى وذويهم في جميع بلدان العالم، حيث تم حساب متوسط تكلفة علاج الطفل الواحد سنوياً بمصر (طفل وزنه ١٥ كجم) تبلغ ٨٤٠ ألف جنيه، وتزداد التكلفة كلما زاد العمر حيث يتم حساب جرعة الدواء طبقاً لوزن المريض. وقال وزير الصحة إن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٠ على دعم ميزانية علاج الأطفال دون السن المدرسي المصابين بمرض جوشية النادر، لافتاً إلى أن مصر يوجد بها حالياً عدد ١١١ طفلاً مسجلاً إصابتهم بالمرض. ومن الجدير بالذكر أن داء جوشية هو مرض وراثي نادر يحدث نتيجة نقص في انزيم معين، يؤدي إلي تراكم الدهون في الخلايا وأجهزة

الجسم خاصة في خلايا الدم البيضاء وفي الطحال والكبد والكلية، والرئة والدماغ والنخاع العظمي.. وهناك ثلاثة أنواع من داء جوشية، النوع الأول (غير العصبي) هو الشكل الأكثر شيوعاً من المرض، وتبدأ الأعراض في سن مبكرة أو في مرحلة البلوغ، وتشمل تضخم الكبد والطحال، وقد يحدث تمزق للطحال وفقر الدم وقلة الصفائح الدموية وقلة كرات الدم البيضاء، أما النوع الثاني (العصبي الطفولي الحاد) ويبدأ عادة في غضون ٦ أشهر من الولادة، وتشمل الأعراض تضخم الكبد والطحال، تلف واسع للمخ، واضطرابات حركة العين، والتيسر، ونوبات تشنجية، وجمود الأطراف، وقدرة ضعيفة على الامتصاص والابتلاع، وعادة ما يموت الأطفال المتأثرين في سن الثانية. بينما النوع الثالث (الشكل العصبي المزمن) يبدأ في أي وقت في مرحلة الطفولة أو حتى في مرحلة البلوغ، ويتميز بكونه يتدرج ببطء، ولكن الأعراض العصبية أكثر اعتدالاً مقارنة مع النوع الثاني أو الحاد.. وقد لا يؤثر المرض على الحياة الطبيعية للمريض طالما بدأ في تلقي العلاج المناسب. ويمكن الكشف عنه من خلال اختبار دم بسيط.